

	EDUCAZIONE SANITARIA PER L'OSSERVAZIONE DOMICILIARE DEL PAZIENTE CON DISTORSIONE DEL RACHIDE CERVICALE	Struttura Complessa di Pronto Soccorso Accettazione Direttore dott.ssa MA Bressan Tel Caposala: 0382/502809 Fax: 0382/423196 e-mail triage@smatteo.pv.it sito internet: www.psapavia.it
Edizione 1	Materiale Informativo MI-12	Valido dal 01.10.2004

Ambulatorio Ortopedia-Traumatologia
Tel. 0382 50 2832

Al momento della visita e dei controlli strumentali in Pronto Soccorso è stata riscontrata un'alterazione della normale curvatura della colonna cervicale. Ciò è particolarmente frequente ed è tipico di uno stato di tensione muscolare.

RIVOLGERSI AL MEDICO CURANTE SE COMPAIONO I SEGUENTI SINTOMI:

- Senso di vertigine**
- Cefalea**
- Formicolio o difficoltà di movimento agli arti**
- Diminuzione della sensibilità al braccio destro o sinistro**

SEGUIRE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI

Se vi è stato consigliato il collare ortopedico, questo deve essere posizionato in modo corretto e va mantenuto durante la posizione eretta.

È possibile rimuovere il collare quando si va a letto, avendo l'accortezza di togliere il cuscino o di usarne uno molto basso.

Inoltre durante l'esecuzione della terapia prescritta dal medico è consigliabile stare a riposo.

(JCI-PFE. 2)

In riferimento a JCI – Standard per Ospedali e per la Sicurezza del Paziente – Maggio 2008

L'equipe infermieristica del Pronto Soccorso

Ed. 1 del 18.06.2010	MI-11 – EDUCAZIONE SANITARIA PER L'OSSERVAZIONE DOMICILIARE DEL PAZIENTE CON CONTUSIONE CRANICA	Pag.1 di 1
----------------------	---	------------